

# 阴道灌洗上药考核评分标准

\_\_\_\_级临床/助产护理\_\_\_\_班      考生姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

项目	分值	扣分原因	应扣分	实扣分	
仪表着装	5	衣服/鞋袜不洁、露发、化妆、戴饰物【戴帽子、口罩，洗手】	各1分		
操作前准备	38	未做健康宣教	2分		
		未嘱病人排空膀胱	2分		
		用物不齐【治疗车、治疗盘、妇科冲洗器（包括：有进液口的袋体、导管、手柄、夹子（相当于灌洗筒）和妇科冲洗棒（相当于灌洗头））、灌洗用药、2个量杯、2把水壶、水温计、纱布罐1个、无菌镊子1把及无菌容器筒1个、无菌卵圆钳1个及无菌容器筒1个、弯盘（其内依次放置：尾纱1个、纱布2块、大镊子2把、窥器、上药所用药物）、治疗巾、输液架、油布、污物桶、鹅颈灯】	每项 0.5分 (共4分)		
		灌洗液种类不正确【根据使用目的配制相应的灌洗液】	2分		
		<b>错误之处</b>	<b>正确做法</b>		
		放药手法不妥	检查第一个量杯的消毒日期，打开包皮，取出量杯	2分	
			将所需剂量药物放于该量杯内	2分	
		配制适宜温度 灌洗液方法不妥	检查第二个量杯的消毒日期，打开包皮，取出量杯，在量杯内配制温水【根据热平衡原理配制】	2分	
			配置灌洗液的量不正确【1000ml】	2分	
			先用镊子取1块无菌纱布放于左手掌心	2分	
			打开包装取出水温计并将之置于第二个量杯内	2分	
			水温计不能触及量杯底部	2分	
			视线与水温计读数刻度处于一个水平面	2分	
			灌洗液准备温度 41~43℃	2分	
			测量水温后未用纱布擦干水温计	2分	
			水温计放入包装内	2分	
			将第二个量杯内少许液体倒入第一个量杯内融化药物，之后将第二个量杯内剩余液体全部倒入第一个量杯内	2分	
		准备用物时违反无菌原则	2分		
环境温度不妥、未遮挡病人	2分				
阴道灌洗	32	未先铺治疗巾于妇科检查床床沿	2分		
		病人体位不正确【膀胱截石位】	2分		
		检查妇科冲洗器质量后，打开外包装，未将外包装袋置于放有黑色垃圾袋的污物桶	2分		
		未关闭妇科冲洗器上的调节器（夹子）	2分		
		未将第一个量杯内的灌洗液倒入妇科冲洗器	2分		
		悬挂妇科冲洗器高度不正确【正常妇科冲洗器挂于距床沿 60~70cm 的输液架上】	2分		
		检查妇科冲洗棒的质量后，打开外包装	1分		
		未戴一次性手套	1分		
		未连接妇科冲洗棒与妇科冲洗器导管前端的手柄，未将外包装袋置于放有黑色垃圾袋的污物桶	2分		
		连接妇科冲洗棒与妇科冲洗器导管前端的手柄后未排气	2分		
		右手持灌洗头，灌洗前未先冲洗外阴让病人试水温【灌洗温度 38~41℃】	2分		

		未用左手分开小阴唇	2分	
		妇科冲洗棒插入阴道方向【右手持妇科冲洗棒沿阴道纵侧壁的方向缓慢插入阴道至阴道后穹隆部】、深度【6~8cm】不妥	2分	
		灌洗时妇科冲洗棒未移动、灌洗不到位【应将妇科冲洗棒围绕宫颈上下左右移动，使阴道四壁都能冲洗到；将阴道分泌物冲出，使灌洗液能达到阴道各部冲净为止】	2分	
		结束灌洗前未观察妇科冲洗器袋体内的灌洗液余量【灌洗液约剩100ml时结束灌洗】	2分	
		灌洗结束时剩余灌洗液未再次冲洗外阴【取出妇科冲洗棒，再冲洗一遍外阴部】	2分	
		操作过程中违反无菌原则	2分	
阴道灌洗后	4	未将妇科冲洗器放进污物桶【放有黄色垃圾袋的污物桶】	1分	
		未协助病人坐起，使阴道内残留灌洗液流净	1分	
		未用1把大镊子夹取1块纱布擦净外阴水迹【放有黄色垃圾袋的污物桶内】	1分	
		扔掉纱布后未将大镊子放进污物桶【器械消毒桶】	1分	
阴道上药	10	上药前未先打开鹅颈灯	1分	
		窥器安放方法不正确【窥器应斜行插入阴道，边插入边转正，窥器固定应以看到宫颈为标准】	2分	
		未用另1把大镊子夹取1块纱布擦净阴道内水迹	2分	
		用该大镊子夹取药片后放置位置不正确【应将药片置于阴道后穹隆】	2分	
		未用该大镊子夹取尾纱放置于阴道内	2分	
		未告知病人取出尾纱时间	1分	
阴道上药后	2	未将上药所用大镊子和窥器放进污物桶【器械消毒桶】	1分	
		未协助病人穿衣，将治疗巾放于污物桶【放有黄色垃圾袋的污物桶】	1分	
整理物品	2	未将用物按标准进行整理	2分	
操作时间	2	操作延时【共15分钟】	1分/min	
理论提问	5			
总分				
备注				

学生操作时间：开始\_\_\_\_\_结束\_\_\_\_\_ 监考教师：\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_